



Instrukcja używania Kijimea® IBS PRO

 **Należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją używania, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Ten wyrób medyczny jest dostępny bez recepty. Aby uzyskać najlepsze możliwe wyniki, Kijimea® IBS PRO należy przyjmować zgodnie z instrukcją używania.**

- Instrukcję używania należy zachować, ponieważ pacjent może chcieć do niej powrócić.
- Należy zapytać lekarza, jeśli pacjent potrzebuje szczegółowych informacji lub porady.
- W przypadku pogorszenia się objawów lub braku poprawy, należy w każdym przypadku zgłosić się do lekarza.

Spis treści instrukcji używania

1. Kiedy stosuje się Kijimea® IBS PRO i jakie jest jego przeznaczenie?
2. Kto może przyjmować Kijimea® IBS PRO?
3. O czym należy pamiętać podczas stosowania Kijimea® IBS PRO?
4. Jak należy przyjmować Kijimea® IBS PRO?
5. Jakie są możliwe działania niepożądane?
6. Jak przechowywać Kijimea® IBS PRO?
7. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje

1. Kiedy stosuje się Kijimea® IBS PRO i jakie jest jego przeznaczenie?

Kijimea® IBS PRO to wyrób medyczny, który zawiera inaktywowany ciepłem szczep bakterii bifido *B. bifidum* HI-MIMBb75.

Stosuje się go w leczeniu zespołu drażliwego jelita z typowymi objawami takimi jak zaparcia, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia oraz wzdęty brzuch.

Wyrób medyczny łagodzi objawy zespołu drażliwego jelita oraz typowe objawy takie jak zaparcia, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia oraz wzdęty brzuch i poprawia jakość życia.

2. Kto może przyjmować Kijimea® IBS PRO?

Kijimea® IBS PRO mogą przyjmować osoby cierpiące na zespół drażliwego jelita z typowymi objawami takimi jak zaparcia, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia oraz wzdęty brzuch lub u których został on zdiagnozowany.

Użytkownik powinien być w stanie połknąć kapsułkę w całości.

W okresie ciąży lub karmienia piersią:

Kijimea® IBS PRO nie została przebadana wśród kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Dzieci:

Kijimea® IBS PRO nie została przebadana wśród dzieci.

Pacjenci z alergiami lub cukrzycą:

Kijimea® IBS PRO nie zawiera substancji konserwujących, słodzących, aromatów, laktozy, fruktozy ani glutenu.

Kijimea® IBS PRO nadaje się również dla pacjentów z cukrzycą.

3. O czym należy pamiętać podczas stosowania Kijimea® IBS PRO?

Kijimea® IBS PRO należy przyjmować zawsze zgodnie z instrukcją używania. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia/środki ostrożności

Kijimea® IBS PRO nie należy przyjmować:

- Bez wystarczającej ilości płynów.
- Po upływie daty ważności wskazanej na opakowaniu .
- W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przeciwwskazania

Nie są znane żadne przeciwwskazania dotyczące stosowania.

Stosowanie Kijimea® IBS PRO z produktami leczniczymi:

Interakcje z produktami leczniczymi nie są znane. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku przyjmowania Kijimea® IBS PRO wraz z produktami leczniczymi, o wszystkich przyjmowanych produktach wcześniej lub które pacjent zamierza przyjmować.

Pozostałe wskazówki:

W przypadku nowych lub długo utrzymujących się dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem, aby rozpoznać przyczynę dolegliwości oraz schorzenie będące ich przyczyną, które wymaga wdrożenia leczenia.



4. Jak należy przyjmować Kijimea® IBS PRO?

Należy stosować się do poniższych wytycznych, o ile lekarz nie wskazał innego stosowania Kijimea® IBS PRO.

Przyjmować 1 x dziennie 2 kapsułki Kijimea® IBS PRO bez rozgryzania popijając wystarczającą ilością wody (np. 1 szklanką wody).

Aby uzyskać optymalne wyniki, Kijimea® IBS PRO należy przyjmować przynajmniej cztery tygodnie, najlepiej dwanaście tygodni. Pierwsze złagodzenie objawów powinno nastąpić po około tygodniu regularnego przyjmowania.

5. Jakie są możliwe działania niepożądane?

Obecnie nie są znane działania niepożądane, również w przypadku przedawkowania. Jednakże zaleca się stosowanie produktu zgodnie z instrukcją używania.

Objawy zespołu jelita drażliwego mogą ulegać naturalnym zmianom w przebiegu choroby i różnić się formą oraz nasileniem.

Dodatkowo różne czynniki zewnętrzne (np. nietypowe odżywianie oraz stres) mogą wzmacniać objawy.

W związku z tym w trakcie przyjmowania Kijimea® IBS PRO może nastąpić przejściowe nasilenie typowych objawów zespołu jelita drażliwego.

W przypadku stwierdzenia działań niepożądanych, należy zgłosić firmie Synformulas GmbH .

Każdy ciężki przypadek, który wystąpił w związku z przyjmowaniem produktu należy zgłosić firmie Synformulas GmbH oraz właściwym władzom kraju członkowskiego.¹

6. Jak przechowywać Kijimea® IBS PRO?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje

Kijimea® IBS PRO zawiera inaktywowany ciepłem szczep bakterii bifido *B. bifidum* HI-MIMBb75 (0,5 x 10⁹ bakterii na kapsułkę).

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, kompleksy miedziowe chlorofilin.

Kijimea® IBS PRO jest dostępna w wielkościach opakowania zawierających 14, 28 oraz 84 kapsułek.

¹Organem właściwym w Polsce jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Synformulas GmbH będzie zgłaszała wszystkie ciężkie przypadki odpowiednim władzom.

